

Cette espèce se place au voisinage du *L. Holstii* Gürke. Elle s'en distingue à première vue par ses verticilles non groupés en tête spiciforme, mais isolés à l'aisselle des feuilles supérieures bien développées, et par ses feuilles à dents en scie, à limbe non arrondi à la base.

Rouwenzori E., vallée du Moboukou à la limite des bambous, 2,600 mètres. janvier 1909. Arbrisseau à fleur blanche.

*63. *LEUCAS* (§ *loscostoma*) *VOLKENSII* Gürke. — Kilima-Ndjaru S. E., ravin boisé de la prairie, à 2,850 mètres, octobre 1908. Fleur blanche.

79. *PLANTAGO FISCHERI* Engler. — Kilima-Ndjaru S. E., zone supérieure des prairies, 3,200 mètres, octobre 1908.

FOUGÈRES RÉCOLTÉES PAR M. POBÉGUIN AU FOUTA DJALLON
(CÔTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE),

PAR M. E. JEANPERT.

M. Pobéguin, administrateur colonial, a récolté une série de Fougères qui font partie maintenant des collections du Muséum et dont voici la liste :

GLEICHENIA LINEARIS Clarke. Pita.

CYATHEA MANNIANA Hook. Plateau de Dalaba, 1,200 mètres.

C. DREGEI Kze. Timbi Medina.

Je rapporte à cette espèce l'échantillon récolté en fruits trop avancés. Elle était signalée jusqu'à présent dans l'Afrique orientale et australe.

ADIANTUM TETRAPHYLLUM Willd.

LONCHITIS PUBESCENS Willd. Pita. La pubescence, la grandeur et la découpe des frondes varient beaucoup dans cette espèce.

CHEILANTHES FARNOSA Kaulf. Diaga.

PELLEA DONIANA Hook.

P. GERANIIFOLIA Fée. var. *KIRKII* (*Cheilanthes Kirkii* Hook). Pita, Diaga.

PTERIS QUADRILABRATA Retz. Pita.

P. ATROVIRENS Willd. Pita.

P. INCISA Thunb (*Histiopteris* J. Sm.). Pita.

PTERIDIUM AQUILINUM Kuhn.

ASPLENIUM FORMOSUM Willd. Gorges de Kala.

A. PRÆMORSUM Sw.

A. VARIABLE Hook. Pita.

A. DREGEANUM Kze (*A. Sandersoni* Hook. var.). Pita, 950 mètres; gorges de Kala.

NEPHRODIUM ALBO-PUNCTATUM Derv. (*Dryopteris orientalis* C. Chr.).

N. UNITUM R. Br. (*Dryopteris gongyloides* O. K.). Pita.

N. PATENS Bak. Pita.

N. PARASITICUM (*N. molle* Desv.). Pita.

NEPHROLEPIS CORDIFOLIA Pr.

POLYPODIUM LYCOPODIODES L. Pita.

ACROSTICHUM VIRENS Wall. var. Pita.

OSMUNDA REGALIS L. Pita.

ANEIMIA TOMENTOSA Sw. var. SESSILIS. Vallée de la Kokrima, Koussi. — Plante de très petite taille, environ 6 centimètres, simplement pennée, à pinnules pinnatifides à nervures bien visibles se terminant dans les crénelures ou dents; panicule fructifère très courte, environ 1 centimètre de longueur, sessile, située au-dessous de la fronde stérile; fronde mince peu poilue.

MARATTIA FRAXINEA Sm. Benkeli.

MISSION SCIENTIFIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE.

LE RIZ SAUVAGE DE L'AFRIQUE TROPICALE,

PAR M. AUG. CHEVALIER.

Au début de la saison sèche on rencontre parfois sur les marchés de quelques grands villages de l'Afrique occidentale, à Saint-Louis du Sénégal, à Ségou sur le Niger, à Teheena au Baguirmi, quelques Calebasses d'un riz grossièrement décortiqué, à grains plus petits et plus allongés que ceux des riz cultivés en Afrique. Ce riz, produit par une plante sauvage, est très estimé des indigènes. S'il est rare sur les marchés, c'est que sa récolte est lente et difficile; mais surtout au Soudan, où il y a de l'eau stagnante, la plante est abondante.

Tous les noirs qui vivent à proximité de surfaces recouvertes par l'inondation en recueillent chaque année une petite quantité, mais ce riz de cueillette est ordinairement consommé en famille ou offert en cadeau.

La plante qui le produit se rencontre en Afrique occidentale et centrale dans la partie nord de la zone soudanaise, là où existent des dépressions inondées à la saison des pluies. On la trouve dans le moyen et le bas